

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ - особо опасная, быстро распространяющаяся, высококонтагиозная вирусная болезнь.

К заболеванию африканской чумой свиней (АЧС) восприимчивы домашние свиньи и дикие кабаны всех возрастов.

Лечение и вакцинопрофилактика отсутствуют. Смертность поголовья животных достигает 100%. Клиническими признаками АЧС являются лихорадка, угнетенное состояние, цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, живота, промежности и хвоста. АЧС сопровождается диареей, кровавыми истечениями из носовой полости, клоническими судорогами, абортами.

Основным источником распространения заразной болезни являются больные домашние свиньи и дикие кабаны. Вирус также может передаваться с инфицированной продукцией свиноводства, полученной от убоя больных свиней, контаминированными кормами, необезвреженными пищевыми и боенскими отходами, а также загрязненной подстилкой. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи.

В соответствии со [ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»](#), в целях недопущения возникновения и распространения АЧС владельцам хозяйств/объектов с содержанием свиней **НЕОБХОДИМО:**

- Обеспечить **индивидуальное маркирование** свиней и их **учет** в учреждениях Госветслужбы.
- **Перемещение свиней (ввоз/вывоз)** осуществлять строго в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарную безопасность животных.
- Карантинировать под контролем специалистов Госветслужбы вновь поступивших животных в течение не менее **30 календарных дней** с момента прибытия свиней в хозяйство.
- Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов Госветслужбы доступ к животным для их осмотра и учета.

Выполнять указания специалистов Госветслужбы о проведении профилактических и противоэпизоотических мероприятий (отбор проб для диагностических исследований, клинические осмотры).

- Соблюдать требования [ветеринарных правил содержания свиней](#).
- Обеспечить безвыгульное содержание свиней, не допускать контакта свиней с другими животными.
- Закрепить отдельный обслуживающий персонал по уходу за свиньями, исключить доступ в животноводческие помещения посторонних лиц.
- При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней обеспечить использование чистых продезинфицированных рабочих одежды и обуви.

В случае посещения охотничьих хозяйств и участия в охоте на диких кабанов обеспечить отсутствие контакта и технологических связей с домашними свиньями.

- Регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений для содержания свиней и инвентаря. Вход в свиноводческие помещения оборудовать дезинфекционными ковриками.

Исключить завоз инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших дезинфекционную обработку.

- Использовать для кормления свиней корма и кормовые добавки, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, **прошедшие термическую обработку. Не использовать для кормления свиней пищевые отходы.**

- Не допускать несанкционированную продажу продукции свиноводства без проведения [ветеринарно-санитарной экспертизы](#).

- **Не допускать** сброс трупов животных и отходов животноводства (навоз) в контейнеры ТБО, полигоны, обочины дорог и их захоронение в землю. [Уничтожение биологических отходов](#) (павшие животные и др.) осуществлять на специализированных предприятиях под контролем специалистов Госветслужбы.

- **Незамедлительно извещать специалистов Госветслужбы по круглосуточному телефону «Контактного центра» 8 (495) 612-12-12:**

- о случаях падежа и (или) заболевания свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- о выявлении на природных и зеленых территориях города Москвы **трупов диких кабанов** и продуктов их убоя.

ВНИМАНИЕ!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

АЧС – особо опасная заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудителем является вирус, который очень устойчив во внешней среде, обладает высокой заразностью и смертностью, достигающей 100%. Болезнь может возникать в любое время года. Средств профилактики (вакцинации) и лечения болезни не существует.

Заболевание может возникнуть при:



- контакте здоровых свиней с зараженными животными - вирусоносителями при ввозе животных из неблагополучных по АЧС хозяйств, а также в результате контакта с дикими кабанями.



- скармливании свиньям зараженных АЧС кормов, продуктов убоя больных свиней и кабанов.



- контакте свиней с инфицированными АЧС клещами.



Инкубационный период

составляет от **5** до **15** суток


Клинические признаки

угнетенное состояние

диарея

температура
до 41-42°C

судороги



посинение или
покраснение кожи
ушей, живота,
пахы

ВНИМАНИЕ!



КАРАНТИН



Для предупреждения возникновения АЧС необходимо выполнять следующие меры:



- не допускать приобретение свиней и кормов без ветеринарных сопроводительных документов;



- исключить захоронение в землю трупов животных и продуктов убоя;



- не приобретать в местах несанкционированной торговли мясо, сало и иную продукцию свиноводства, а также продукты охоты на кабана.



- строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней, указания и требования специалистов госветслужбы о проведении диагностических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;



- обеспечивать биологическую защищенность хозяйств;



- содержать свиней без свободного выгула, отсутствия доступа к ним посторонних лиц и животных;



- регулярно проводить уборку, а также дезинфекцию мест содержания свиней и обработку от кровососущих насекомых, клещей;



В случае выявления заболевания или падежа свиней, а также при обнаружении трупов животных, боенских отходов немедленно информировать госветслужбу города Москвы по тел: 8 (495) 612-12-12 (круглосуточно)

