

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ

С учетом напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в мире и миграционных процессов дикой птицы, являющейся природным резервуаром ВГП, угроза заноса возбудителя болезни на территорию города Москвы сохраняется.

Высокопатогенный грипп птиц (ВГП) – особо опасная заразная болезнь общая для человека и животных.

К высокопатогенному гриппу птиц восприимчивы:

- сельскохозяйственные птицы (куры, утки, перепела, индейки др.);
- дикие и синантропные птицы (чайки, утки, лебеди, голуби, вороны, галки и др.)
- декоративные и экзотические птицы;
- крупный рогатый скот, свиньи, лошади, хорьки, кошки, собаки и иные животные.

Основными признаками заболевания у птицы являются снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов, отек межжелудочного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Факторами передачи и распространения ВГП из природной среды являются загрязненные возбудителем растения, почва, вода, а также прямой контакт восприимчивого поголовья с инфицированной синантропной и дикой птицей.

Основными причинами возникновения очагов заразных болезней птиц в хозяйствах является низкий уровень ветеринарной (биологической) защищенности объектов птицеводства, несоблюдение владельцами ветеринарных правил содержания птиц и профилактики заразных болезней, занос инфекций с ввозимыми больными (инфицированными) птицами и небезопасными в ветеринарном отношении продукцией животного происхождения, кормами для животных.

В соответствии со [ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»](#), в целях недопущения заноса и распространения заразных болезней животных, обеспечения эпизоотического благополучия хозяйств/объектов с содержанием птицы, предотвращения причинения вреда животным и здоровью людей, **НЕОБХОДИМО**:

1. Обеспечить [маркирование \(индивидуальное или групповое\)](#) птиц в целях обеспечения прослеживаемости их происхождения и движения, а также учет птиц в [учреждениях Государственной ветеринарной службы города Москвы](#) (далее – Госветслужба).

2. Проводить мероприятия по профилактике болезней животных. Предоставлять ветеринарным специалистам Госветслужбы по их требованию птицу для проведения обязательных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (клинические осмотры, отбор проб для диагностических исследований, вакцинации против ВГП и др.).

3. **Не приобретать птицу в несанкционированных местах торговли.** Ввоз птицы, инкубационного яйца, цыплят для комплектования организаций/хозяйств осуществлять строго при наличии [ветеринарных сопроводительных документов](#),

подтверждающих их ветеринарную безопасность.

При перемещении (ввозе/вывозе) птицы соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона на территории которого расположено хозяйство в соответствии с [регионализацией Российской Федерации](#).

4. Карантинировать под контролем специалистов Госветслужбы вновь поступивших и планируемых к вывозу птиц.

5. Выполнять требования [ветеринарных правил содержания птиц](#).

6. **Не допускать контакт содержащихся птиц с синантропной и дикой птицей.** В каждом помещении для содержания птицы окна, двери, вентиляционные отверстия оборудовать рамами с сеткой во избежание контакта с синантропной и дикой птицей, и проникновения грызунов. **Не допускать выгул птицы** (за исключением выгула на изолированной выгульной площадке).

7. Использовать для кормления птиц корма прошедшие термическую обработку. Приобретать корма (кормосмеси, кормовые добавки) безопасные для здоровья птиц, происходящих из местности благополучной по заразным болезням.

Обеспечить изолированное хранение кормов с целью недопущения контаминации экскрементами диких и синантропных птиц.

Не допускать россыпи корма на территории хозяйства во избежание привлечения дикой птицы.

8. Помет хранить и обеззараживать в помехранилищах, расположенных на территории хозяйства вне птицеводческих помещений.

9. Регулярно проводить тщательную механическую очистку и дезинфекцию помещений для содержания птицы, дезинфекцию оборудования и инвентаря.

Оборудовать вход в помещения для содержания птицы дезинфекционными ковриками во всю ширину прохода.

10. Закрепить отдельный обслуживающий персонал по уходу за птицей, исключить доступ в птицеводческие помещения посторонних лиц. Уход за птицей осуществлять в специальной одежде и обуви с соблюдением правил личной гигиены. Организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за птицей.

11. Исключить содержание добытых охотничьих ресурсов (отловленных диких водоплавающих птиц) в хозяйстве, потрошение охотничьей дичи на территории хозяйства и скармливание отходов домашним животным.

12. Биологические отходы (трупы птиц, отходы убоя птиц и др.) [уничтожать путем сжигания на специализированных предприятиях в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов](#).

[Не допускать сброс трупов птиц, отходов от их содержания в мусорные контейнеры и их захоронение в землю](#) и загрязнение окружающей среды отходами птицеводства.

О всех случаях гибели и (или) заболевании животных (в том числе птиц), обнаружении трупов диких животных (в том числе птиц), выявлении фактов сброса в окружающую среду биологических отходов (трупов животных, отходов убоя и переработки животных) необходимо **незамедлительно информировать ветеринарных специалистов Госветслужбы ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (495) 612-12-12.**

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ (ВГП)

ВГП – особо опасная заразная болезнь домашних и диких птиц, к которой восприимчив человек. Возбудителем является вирус, обладающий высокой устойчивостью во внешней среде и заразностью для сельскохозяйственной птицы (куры, индейки, утки, цесарки, перепела и др.). Смертность может достигать 100%. Болезнь может возникать в любое время года, однако риск заболевания повышается в период весенне-осенней миграции диких птиц.

Источник заражения больные и переболевшие птицы – вирусоносители

Факторами передачи являются:

-  - пух, перо
-  - тушки убитых и павших птиц
-  - зараженные корма и инвентарь

Выделение вируса от больной птицы происходит с пометом, секретами и инкубационным яйцом



Инкубационный период

составляет от 1 до 21 суток



ВНИМАНИЕ!

КАРАНТИН



Для предупреждения возникновения ВГП необходимо выполнять следующие меры:

-  - не допускать приобретение птицы, инкубационного яйца и кормов без ветеринарных сопроводительных документов;
-  - исключить захоронение в землю трупов птиц и продуктов убоя;
-  - не приобретать в местах несанкционированной мясо и продукцию птицеводства, а также продукты охоты на птиц;
-  - строго соблюдать ветеринарные правила содержания птицы, указания и требования специалистов госветслужбы о проведении диагностических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
-  - обеспечить изолированное хранение кормов от синантропной птицы (воробьев, голубей);
-  - содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих контакт с дикой и синантропной птицей, а также с посторонними лицами, не допускать свободного выгула птицы;
-  - регулярно проводить уборку, а также дезинфекцию мест содержания птицы;
-  - соблюдать правила личной гигиены, уход за птицей осуществлять в спецодежде.

В случае выявления заболевания или падежа птиц, а также при обнаружении трупов животных, боенских отходов немедленно информировать госветслужбу города Москвы по тел: 8 (495) 612-12-12 (круглосуточно)



ПОМНИТЕ! Инкубационный период обычно длится 1 – 5 суток, максимум 21 сутки.

Источник инфекции – больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде птицы, выделяющие вирус с истечениями из носовой и ротовой полостей, фекалиями и яйцом, при кашле и чихании.

При остром течении отмечают угнетенное состояние, сонливость, истечение тягучей слизи из клюва, конъюнктивит, повышение температуры тела, диарею, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородок и лап, шаткость походки, судороги, парезы и параличи. У кур-несушек резко снижается продуктивность. Смертность может достигать 100%.

Болезнь может протекать бессимптомно, и птицы длительное время остаются вирусоносителями.

Федеральная служба по ветеринарному
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)



www.fsvps.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»



www.arriah.ru

Памятка населению и фермерам

**по недопущению заноса и
распространения вируса
высокопатогенного гриппа
птиц в популяции домашних
птиц**



Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

www.fsvps.ru/fsvps/flu/

ВНИМАНИЕ! Установлено, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

Наиболее уязвимыми секторами являются личные подворные хозяйства и мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. В целях недопущения заноса вируса гриппа и распространения инфекции, профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:

- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;

- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждение из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);

- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;

- не допустить потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скормливание отходов домашним животным;

- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;

- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;

- производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;

- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников, воздерживаясь от покупки живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и скормливание животным подозрительной в заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).

7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин, хлорная известь) и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.

10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.

**Смертность поголовья птицы
может достигать 100%**

